

Název vyšetření: **Endomysium**

Vyšetření protilátek v lidském séru proti endomysia imunofluorescenční metodou ve třídě IgA a IgG.

Endomysium je složka pojivové tkáně, která obklopuje snopce hladkých svalů v určitých lokalizacích. Přítomnost protilátek třídy IgA proti endomysiu je vysoce citlivým a specifickým diagnostickým průkazem glutenové enteropatie.

Zkratka:	endomys		
Pracoviště:	mikrobiologie	Telefon: kl.424	
Materiál:	srážlivá krev	Minimální množství: 5 ml	
Pokyny k odběru:	zkumavky s aktivátorem srážení nebo s gelem + aktivátorem srážení pro srážlivou krev		
Četnost (odezva):	týdně	Zpracováno:	pondělí
Transport:	co nejdříve do laboratoře při pokojové teplotě		
Stabilita v laboratoři:	Čas: 7 dní	Teplota: 2 - 8°C	
Interference:	séra bakteriálně kontaminovaná, hemolytická, chylózní		
Vykazování pro pojišťovnu: rutina	Výkon-kód: 82 113		
SOP číslo – název:			
Jednotka:	Ne		
Poznámka:	Běžně je vyšetřována transglutamináza společně s endomysiem - vyšetření céliakie soubor.		

Referenční meze:

Protilátka	Referenční hodnota
Endomysium:	Negativní – hraniční – pozitivní