

Název vyšetření: Autoprotilátky proti tyreoglobulinu

Zkratka	antTGN, anti-Tg	Režim: Rutina
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	srážlivá krev	Minimální množství: 7,5 ml
Pokyny k odběru:	odběr provádět na lačno, do monovett obsahujících separační gel + aktivátor srážení	
Četnost (odezva):	2x týdně	
Transport:	čas:	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	teplota:	20 – 25°C
Stabilita v laboratoři:	čas:	3 dny
	teplota:	2 – 8 °C
Interference:	vysoké dávky biotinu – odběr provádět za 8 hodin po poslední dávce	
Vykazování pro pojišťovnu: rutina	Výkon-kód: 93231	Bod: 366
SOP číslo:	SOP-PLO-OKB-55	
Jednotka:	IU/ml	
Poznámka:		

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena/muž	0 – 5 den	< 134
žena/muž	6 den – 3 měsíc	< 146
žena/muž	4 měsíce – 12 měsíců	< 130
žena/muž	1 – 6 let	< 38
žena/muž	7 – 11 let	< 37
žena/muž	12 – 20 let	< 64
žena/muž	21 – 120 let	< 115