

## Název vyšetření: Imunoglobulin A

<b>Zkratka</b>	<b>IgA</b>	<b>Režim: Rutina</b>
<b>Pracoviště:</b>	CLA – biochemie	<b>Telefon: 419</b>
<b>Materiál:</b>	srážlivá krev	<b>Minimální množství: 7,5 ml</b>
<b>Pokyny k odběru:</b>	odběr provádět na lačno do monovett obsahujících separační gel + aktivátor srážení	
<b>Četnost (odezva):</b>	denně	
<b>Transport:</b>	<b>čas:</b>	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	<b>teplota:</b>	20 – 25 °C
<b>Stabilita laboratoři:</b>	<b>čas:</b>	8 měsíců
	<b>teplota:</b>	2 – 8 °C
<b>Interference:</b>	hemolýza, ikterita, lipemie	
<b>Vykazování pro pojišťovnu: rutina</b>	<b>Výkon-kód:</b> 91131	<b>Bod:</b> 153
<b>SOP číslo:</b>	SOP-PLO-OKB-32	
<b>Jednotka:</b>	g/l	
<b>Poznámka:</b>		

### Referenční meze:

<b>Pohlaví</b>	<b>Věk</b>	<b>Referenční hodnota</b>
žena/muž	0 – 12 měsíců	0,0 – 0,83
žena/muž	1 – 3 roky	0,2 – 1,0
žena/muž	4 – 6 let	0,27 – 1,95
žena/muž	7 – 9 let	0,34 – 3,05
žena/muž	10 – 11 let	0,53 – 2,04
žena/muž	12 – 13 let	0,58 – 3,58
žena/muž	14 – 15 let	0,47 – 2,49
žena/muž	16 – 17 let	0,61 – 3,48
žena/muž	18 – 120 let	0,7 – 4,0

