

## Název vyšetření: Orální glukózový toleranční test

<b>Zkratka</b>	<b>oGTT Glu0P, Glu2P</b>	<b>Režim: Rutina</b>
<b>Pracoviště:</b>	CLA – biochemie	<b>Telefon:</b> 419
<b>Materiál:</b>	nesrážlivá krev	<b>Minimální množství:</b> 5 ml
<b>Pokyny k odběru:</b>	první odběr v čase 0 provádíme na lačno, ihned po prvním odběru vypije pacient standartní roztok glukózy, který si přinesl s sebou druhý odběr se provádí za dvě hodiny po vypití standartního roztoku glukózy odběry se provádí do zkumavek s obsahem K <sub>2</sub> EDTA+ natrium fluorid – žlutý uzávěr před odběry by se měl pacient vyvarovat kouření, alkoholu a zvýšené fyzické aktivity	
<b>Četnost (odezva):</b>	denně	
<b>Transport:</b>	<b>čas:</b>	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	<b>teplota:</b>	20 – 25 °C
<b>Stabilita v laboratoři:</b>	<b>čas:</b>	72 hodin
	<b>teplota:</b>	2 – 8 °C
<b>Interference:</b>	hemolýza	
<b>Vykazování pro pojišťovnu: rutina</b>	<b>Výkon-kód:</b> 81439	<b>Bod:</b> 12
<b>SOP číslo:</b>	SOP-PLO-OKB-118	
<b>Jednotka:</b>	mmol/l	
<b>Poznámka:</b>	standartní roztok glukózy si před návštěvou odběrové ambulance vyzvedne pacient v nemocniční lékárně, kde mu bude vydán po předložení receptu, roztok si pacient hradí sám, s tímto pak přijde k prvnímu odběru na lačno	

### Referenční meze:

<b>Pohlaví</b>	<b>Věk</b>	<b>Referenční hodnota</b>
žena/muž	0 – 120 let	0 hod. – 3,3 – 5,59
žena/muž	0 – 120 let	2 hod. – 3,3 – 7,79