

Název vyšetření: Orální glukózový toleranční test – gravidní

Zkratka	oGTPg Glu0Pg, Glu2Pg	Glu1Pg	Režim: Rutina
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419	
Materiál:	srážlivá krev	Minimální množství: 5 ml	
Pokyny k odběru:	první odběr v čase 0 provádíme na lačno, ihned po prvním odběru vypije pacientka standardní roztok glukózy, který si přinesla s sebou druhý odběr se provádí za hodinu po vypití standardního roztoku glukózy třetí odběr se provádí za dvě hodiny po vypití standardního roztoku glukózy odběry se provádí do zkumavek s obsahem K ₂ EDTA+ natrium fluorid – žlutý uzávěr před odběry by se měla pacientka vyvarovat kouření a zvýšené fyzické aktivitě		
Četnost (odezva):	denně		
Transport:	čas:	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru	
	teplota:	20 – 25 °C	
Stabilita v laboratoři:	čas:	72 hodin	
	teplota:	2 – 8 °C	
Interference:	hemolýza		
Vykazování pro pojišťovnu: rutina	Výkon-kód: 81439	Bod: 12	
SOP číslo:	SOP-PLO-OKB-118		
Jednotka:	mmol/l		
Poznámka:	standardní roztok glukózy si před návštěvou odběrové ambulance vyzvedne pacientka v nemocniční lékárně, kde jí bude vydán po předložení receptu, roztok si pacientka hradí sama, s tímto pak přijde k prvnímu odběru na lačno		

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena	0 – 120 let	0 hod. - 3,3 – 5,1
žena	0 – 120 let	1 hod. – 3,3 – 9,99
žena	0 – 120 let	2 hod. – 3,3 – 8,49