

Název vyšetření: Tyroxin volný

Zkratka	fT4	Režim: Rutina
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	srážlivá krev	Minimální množství: 7,5 ml
Pokyny k odběru:	odběr provádět na lačno do monovett obsahujících separační gel + aktivátor srážení	
Četnost (odezva):	denně	
Transport:	čas:	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	teplota:	20 – 25 °C
Stabilita laboratoři:	čas:	7 dní
	teplota:	2 – 8 °C
Interference:	hemolýza, ikterita, lipemie, vysoké dávky biotinu – odběr možný nejdříve po 8 hodinách po poslední dávce	
Vykazování pro pojišťovnu: rutina	Výkon-kód: 93189	Bod: 153
SOP číslo:	SOP-PLO-OKB-54	
Jednotka:	pmol/l	
Poznámka:		

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena/muž	0 – 5 dní	11,0 – 32,0
žena/muž	6 dní – 3 měsíce	11,5 – 28,3
žena/muž	4 – 12 měsíců	11,9 – 25,9
žena/muž	1 – 6 let	12,3 – 22,8
žena/muž	7 – 11 let	12,5 – 21,5
žena/muž	12 – 18 let	12,6 – 21,0
žena/muž	19 – 120 let	12,0 – 22,0