

Schistocyty

Jedná se o patologické červené krvinky, respektive útržky erytrocytů tvaru helmice, či prasklé vaječné skořápky. Vznikají mechanickým poškozením erytrocytu (např. přetržením erytrocytu na fibrinových vláknech). Fyziologicky se v krvi nevyskytují, pouze za určitých patologických stavů (např. mikroangiopatie). Jsou i součástí DIFMAN.

Zkratka:	SCH	
Pracoviště:	hematologie	Telefon: 568 809 342
Biologický materiál:	venózní krev	
Odběrová zkumavka:	plná nesrážlivá krev (EDTA)	Doporučené množství: 1 zkumavka přesně odebraná
Četnost (odezva):	Statim 1 hodina, rutina 2 hodiny.	
Transport:	Dodat optimálně do 2 hodin po odběru při 15 až 25 °C.	
Stabilita vzorku:	5 hodin při 15 až +25 °C.	
Vykazování pro pojišťovnu: rutina, statim	Výkon-kód: 96 711 panoptické obarvení nátěru 96 713 zhotovení nátěru 96 613 analýza krevního nátěru na SCH	Bod: 24 12 25
SOP číslo – název:	SOP-PLO-HEM-03 Panoptické barvení a morfologické hodnocení nátěrů periferní krve	
Jednotka:	/1000 ery	
Poznámka:	Omezení: Vzorek nelze přijmout, je-li: sražený, chybně uzavřená zkumavka, množství z venózního odběru pod 1 ml, u kapilárního odběru pod 0,25 ml, odběr je proveden do nevhodného media, není dodržen obecně platný předpis pro příjem materiálu.	

Referenční mez
0,0 – 10,0