

Rh faktor

Skupinový systém Rh je významným skupinovým systémem erytrocytů. Jde o složitý skupinový systém, který obsahuje celkem 7 antigenů, z nichž největší důležitost se přikládá antigenu D. Podle jeho přítomnosti či nepřítomnosti v krvinkách rozlišujeme Rh + a Rh – jedince. Antigeny Rh systému patří mezi klinicky nejvýznamnější antigeny erytrocytové membrány. Hrají důležitou roli při hemolytickém onemocnění novorozence, potransfuzní reakci, autoimunní hemolytické anemii.

Zkratka:	RH	
Pracoviště:	hematologie	Telefon: 568 809 339
Biologický materiál:	venózní krev	
Odběrová zkumavka:	plná nesrážlivá krev (citrát sodný)	Doporučené množství: 1 zkumavka přesně odebraná
Četnost (odezva):	statim 1 hodina, rutina max. 7 dní	
Transport:	Dodat optimálně do 2 hodin po odběru při 15 až 25 °C.	
Stabilita vzorku:	7 dní při 2 až 8 °C.	
Interference:	Podávání imunosupresiv, chemoterapie, podávání cytostatik.	
Vykazování pro pojišťovnu: statim, rutina	Výkon – kód: 22 112 stanovení krevní skupiny, Rh 22 113 stanovení krevní skupiny, Rh novorozenci 97 111 separace séra nebo plasmy	Bod: 163 150 17
SOP číslo – název:	SOP-PLO-HEM-33 Stanovení Rh faktoru, zkumavková metoda	
Jednotka:		
Poznámka:	Omezení: jsou-li viditelné známky hemolýzy, chylózní plasma nebo sérum, nesprávně nebo neúplně označený vzorek, chybně uzavřená zkumavka, množství z venózního odběru pod 2,5 ml, odběr je proveden do nevhodného média, není dodržen obecně platný předpis pro příjem materiálu.	