

## ŽÁDANKA O LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ

|                     |                                                   |           |       |
|---------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------|
| Příjmení:           |                                                   |           |       |
| Jméno:              |                                                   |           |       |
| Adresa pacienta:    |                                                   |           |       |
| Datum narození:     |                                                   | Pohlaví:  | M / Ž |
| Číslo pojištěnce:   |                                                   |           |       |
| Kód pojišťovny:     |                                                   | Diagnóza: |       |
| Datum a čas odběru: |                                                   |           |       |
| Materiál:           | krev - plasma<br>arteriální - venózní - kapilární |           |       |

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>CENTRALNÍ LABORATOR</b>           |
| <b>HEMATOLOGIE</b>                   |
| Razítko (včetně ICP) a podpis lékaře |
| Odebral (razítko, podpis)            |

### Hematologie

plná krev K3EDTA

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| KO                    | Krevní obraz                                |
| KO-O <sup>6</sup>     | Krevní obraz ostatní (punktát, ...)         |
| KODIF                 | Krevní obraz + 5 - ti populační diferenciál |
| RETIC                 | Retikulocyty                                |
| DIFMAN                | Manuálně diferenciál                        |
| MORF.E                | Morfologie erytrocytů                       |
| SCH                   | Schistocyty                                 |
| WBC DIAL <sup>6</sup> | Leukocyty dialyzát                          |
| PER <sup>15</sup>     | Myeloperoxidáza                             |
| FE <sup>24</sup>      | Železo ze sternální punkce                  |
| SP <sup>24</sup>      | Sternální punkce                            |

### Imunohematologie

plazma - citrát sodný 3,2 %

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| KS                   | Krevní skupina                          |
| RH                   | Rh                                      |
| NAT                  | Antieritocytární protilátky - screening |
| CHLAD <sup>467</sup> | Chladové aglutininy                     |
| PAT KL               | Přímý antiglobulinový test kvalitativně |
| COOMT.T              | Coombsův test (PAT + NAT)               |

### Koagulace

plazma - citrát sodný 3,2 %

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| PT                       | Protrombinový test                         |
| APTT                     | Aktivovaný parciální tromboplastinový test |
| D-DI                     | D - dimery                                 |
| AT                       | Antitrombin                                |
| TT                       | Trombinový test                            |
| FIB                      | Fibrinogen                                 |
| DK <sup>3</sup>          | Doba krvácivosti                           |
| PROT-C <sup>68</sup>     | Protein C                                  |
| PROT-S <sup>68</sup>     | Protein S                                  |
| PROCGL <sup>68</sup>     | Pro C Global                               |
| RETKO <sup>6</sup>       | Retrakce koagula                           |
| FBL <sup>6</sup>         | Fibrinolýza                                |
| FVIII <sup>68</sup>      | Faktor VIII                                |
| a-Xa <sup>9</sup>        | Heparin anti-Xa                            |
| a-Xa R (X) <sup>10</sup> | Heparin anti-Xa Rivaroxaban (Xarelto)      |
| a-Xa A (E) <sup>10</sup> | Heparin anti-Xa Apixaban (Eliquis)         |
| INHIB                    | Inhibitor, orientační metoda               |
| vWf <sup>68</sup>        | Von Willebrandův faktor                    |

plazma - citrát sodný 3,8 %

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| AGRE <sup>6</sup> | Agregace trombocytů odběr na hema amb. |
|-------------------|----------------------------------------|

Statimové vyšetření označit!

Mimo specifikovaných vzorky dodat do laboratoře do 2 hod. od odběru.

V případě koagulace nutno vyplnit antikoagulační terapii, u agregací antiagregační terapii a typ agregace.

### Klinické informace o pacientovi

|  |
|--|
|  |
|--|

### U prenatalního vyšetření uveďte

|                                              |  |
|----------------------------------------------|--|
| Transfuze (kdy)                              |  |
| Kolikáté těhotenství                         |  |
| Počet porodů                                 |  |
| Počet potratů                                |  |
| Týden gravidity                              |  |
| Výsledek předchozích serologických vyšetření |  |

### Uveďte antikoagulační terapii

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| kumariny (Warfarin, Lawarin,...)                      |
| UFH-nefrakcionovaný heparin (heparin)                 |
| LMWH-nízkomolek. heparin (Clexane, Fragmin,...)       |
| přímá antikoagulancia (Xarelto, Pradaxa, Eliquis,...) |

### Uveďte antiagregační terapii

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| kys. acetylsalicylová (Anopyrin, Godasal, Stacyl, |
| antagonisté P2Y12 (Clopidogrel, Trombex,...)      |
| jiná antiagregancia (Apo-tic, Tagren,...)         |
| kombinovaná antiagregancia (Aggrenox ...)         |

### U agregace prosím uveďte typ

|                               |
|-------------------------------|
| samovolná                     |
| po indukci kolagenem          |
| po indukci ADP                |
| po indukci kys. arachidonovou |
| po indukci ristocetinem       |

1 odběr z kostní dřeně či plné krve

2 odběr z kostní dřeně (KD)

3 odběr na hematologické ambulanci (HA)

4 odběr na hematologické ambulanci či po domluvě s laboratoří

5 odběr z KD na HA či po domluvě s laboratoří

6 dodat do laboratoře ihned po odběru

7 dodat do laboratoře zabalené v buničité vatě

8 četnost vyšetření 1x za 3 měsíce

9 odběr za 3-4 hod po aplikaci (a-Xa)

10 odběr za 3-4 hod po aplikaci (a-Xa) - max. účinek, před podáním další tablety - min. účinek